



Artigo: Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018

Publicação: J Bras Pneumol. 44(5):405-423

DOI: 10.1590/S1806-3756201800000130

Na página 416, Quadro 6, onde se lia:

“**Quadro 6.** Posologia e vias de administração de antibióticos utilizáveis no tratamento da pneumonia adquirida na comunidade.”

Leia-se (alterações destacadas em negrito):

Quadro 6. Posologia e vias de administração de antibióticos utilizáveis no tratamento da pneumonia adquirida na comunidade.

Fármaco	Via	Dose	Intervalo, h
Amoxicilina	Oral	500 mg	8
Amoxicilina/ácido clavulânico	Oral	875/125 mg	12
Amoxicilina/ácido clavulânico	Oral	500/125 mg	8
Amoxicilina/ácido clavulânico	Intravenosa	1.000/200 mg	8*
Ampicilina/sulbactam	Intravenosa	1.5/3.0 g	6-8
Azitromicina	Oral-intravenosa	500 mg	24
Cefepima	Intravenosa	2g	12
Cefotaxima	Intravenosa	1-2 g	8
Ceftarolina	Intravenosa	600 mg	12
Ceftriaxona	Intravenosa	1 g	12
Ciprofloxacino	Oral	500-750 mg	12
Ciprofloxacino	Intravenosa	400 mg	8-12
Claritromicina	Oral	500 mg	12
Claritromicina liberação prolongada	Oral	1.000 mg	24
Claritromicina	Intravenosa	500mg	12
Clindamicina	Oral	600 mg	8-12
Clindamicina	Intravenosa	600 mg	8
Ertapenem	Intravenosa	1 g	24
Imipenem	Intravenosa	1 g	8
Levofloxacino	Oral	500-750 mg	24
Levofloxacino	Intravenosa	500-750 mg	24
Linezolida	Oral-intravenosa	600 mg	12
Meropenem	Intravenosa	1 g	8
Moxifloxacino	Oral-intravenosa	400 mg	24
Piperacilina-tazobactam	Intravenosa	4,0/0,5 g	6-8
Vancomicina	Intravenosa	500/1.000 mg	6/12

***Em infecções mais graves considerar o intervalo de 6/6 horas.**